


## 接種間隔


予防接種を受けた後、次の接種を受けるときは、その効果及び安全性のため、最低下記の期間をあけることになっています。(家族で海外で暮らすことになる等、特に急いで接種する必要がある場合は、かかりつけ医に相談しましょう。)

生ワクチン	
定期	・麻しん風しん (MR) ・BCG ・水痘 (水ぼうそう)
任意	・おたふくかぜ ・ロタウイルス



次の予防接種まで 4週間 (27日) 以上あけること。  
※ただし、同じワクチンを受ける場合は、接種間隔は別に定められた間隔があります。  
下記<接種間隔の例>参照

不活化ワクチン	
定期	・B型肝炎 ・ヒブ ・小児用肺炎球菌 ・四種混合 (DPT-IPV) ・二種混合 (DT) ・日本脳炎
任意	・インフルエンザ



次の予防接種まで 1週間 (6日) 以上あけること。  
※ただし、同じワクチンを受ける場合は、接種間隔は別に定められた間隔があります。  
下記<接種間隔の例>参照

### <接種間隔の例>

#### 1) 生ワクチン接種後

(例) 生ワクチン (BCG) 接種後、四種混合を受ける場合

週	日	月	火	水	木	金	土
0		4/1	2	3	4	5	6
1	7	8	9	10	11	12	13
2	14	15	16	17	18	19	20
3	21	22	23	24	25	26	27
4	28	29	30	31	5/1	2	3
1	4	5	6	7	8	9	10

- ・4週間 (27日) 以上間隔をあけなければなりません。
- ・BCGを4月2日に接種した場合は、4月30日以降に四種混合を受けることができます。

※同一曜日の接種可能

#### 2) 不活化ワクチン接種後

(例) 不活化ワクチン (四種混合) 接種後、BCGを受ける場合

週	日	月	火	水	木	金	土
0		4/1	2	3	4	5	6
1	7	8	9	10	11	12	13
2	14	15	16	17	18	19	20
3	21	22	23	24	25	26	27
4	28	29	30	31	5/1	2	3
	4	5	6	7	8	9	10

- ・1週間 (6日) 以上間隔をあけなければなりません。
- ・四種混合を4月2日に接種した場合は、4月9日以降にBCGを受けることができます。

※同一曜日の接種可能

### 3) 同じ種類のワクチンを受ける場合

(例) 四種混合（不活化ワクチン）1期初回1回目を接種後、2回目を受ける場合

週	日	月	火	水	木	金	土
0		4/1	2	3	4	5	6
1	7	8	<del>9</del>	10	11	12	13
2	14	15	16	17	18	19	20
3	21	22	23	24	25	26	27
4	28	29	30	31	5/1	2	3
1	4	5	6	7	8	9	10

- ・1期初回1回目と2回目の間隔は20日から56日です。1週間（6日）ではありません。
- ・1期初回1回目を4月2日に接種した場合は、4月23日以降に2回目を受けることができます。

※同一曜日の接種可能

### 4) 気をつけるべき事例（生ワクチンを接種した場合）

(例) 水痘初回（生ワクチン）接種後、四種混合1期追加（不活化ワクチン）を受け、次に水痘追加（生ワクチン）を接種する場合

週	日	月	火	水	木	金	土
0		4/1	2	3	4	5	6
1	7	8	9	10	11	12	13
2	14	15	16	17	18	19	20
3	21	22	23	24	25	26	27
4	28	29	30	31	5/1	2	3
1	4	5	<del>6</del>	7	8	9	10

- ・水痘初回を4月2日に接種し、4月30日に四種混合1期追加を受け、次に水痘追加を受けられるのは、1週間（6日）後ではありません。
- ・水痘初回を受けた後、水痘追加を受ける場合は、最低3か月以上あけなければなりません。よって、次の水痘追加は、3か月後の6月2日以降となります。

週	日	月	火	水	木	金	土
0	6/1	2	3	4	5	6	7